

FLURITOX® F SOBRES



CORPORACIÓN
FARMAYALA
Su salud es nuestro COMPROMISO.

Quita marcas
de agua Wondershare
PDFelement

PRINCIPIO ACTIVO:

Cada sobre de 7 g contiene:
Acetaminofén 500 mg
Cetirizina diclorhidrato 5 mg
Fenilefrina Clorhidrato 10 mg.
Excipientes c.s.p.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

GRUPO FARMACOTERAPÉUTICO:

Analgésico/Antipirético; Descongestionante nasal; Antialérgico.

MECANISMO DE ACCIÓN:

- Acetaminofén: es un analgésico y antipirético no narcótico con acción selectiva en el sistema nervioso central sin bloqueo cortical. Su efecto terapéutico se prolonga hasta por seis horas sin producir irritación gástrica a dosis terapéuticas.
- Cetirizina: es un potente agente antialérgico por sus propiedades de bloqueo de receptores H1 periféricos. Controla la fase tardía de la reacción alérgica, ya que impide la degranulación del mastocito, inhibe la migración de eosinófilos y otras células inflamatorias como neutrófilos y monocitos e inhibe otros factores mediadores de la inflamación.
- Fenilefrina: es un descongestivo nasal que produce vasoconstricción que temporalmente reduce la inflamación de membranas mucosas que tapizan las vías nasales. Su acción en el corazón incluye elevación del ritmo cardiaco y reducción de su rendimiento.

PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS:

- Acetaminofén: su absorción en el tubo digestivo es rápida y completa, con una vida media de 4 horas aproximadamente, de 90 a 95% se conjuga primariamente con el ácido glucurónico y se elimina por excreción urinaria a través de diferentes metabolitos; sólo 3% se elimina sin cambios después de una administración oral única.
- Cetirizina: es rápidamente absorbida con un tiempo máximo de concentración de aproximadamente una hora después de la administración de cualquier presentación oral en adultos. La vida media de eliminación es de 10 horas.
- Fenilefrina: es absorbido de forma rápida e irregular en el tracto gastrointestinal. Se metaboliza rápidamente en el intestino e hígado mediante la enzima monoaminoxidasa. Los efectos farmacológicos aparecen rápidamente y pueden durar varias horas. Tiene una biodisponibilidad oral de 38 % y su vida media de eliminación es de 2 a 3 horas.

INDICACIONES:

- Síntomas y signos que acompañan a la gripe como: malestar general, dolores musculares, cefalea, fiebre, odinofagia, otalgia, estornudos, secreción, congestión u obstrucción nasal.
- Resfriado común.
- Otitis viral.
- Rinorrea u obstrucción nasal.
- Congestión conjuntival.
- En el tratamiento de los síntomas asociados a la rinitis alérgica estacional.

CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.
- Afecciones hepáticas muy severas.
- Por contener simpaticomimético (Fenilefrina), esta contraindicado en pacientes con hipertensión grave, insuficiencia coronaria grave, en tratamiento con inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO), pacientes con presión intraocular elevada o retención urinaria.
- Embarazo y lactancia.
- Menores a 12 años.

REACCIONES ADVERSAS

El Paracetamol puede ser hepatotóxico a dosis excesivas o sobredosis. Las reacciones de hipersensibilidad pueden manifestarse por urticaria, eritema, rash y fiebre. Puede presentarse además: ligera somnolencia, mareo, náuseas, constipación.

PRECAUCIONES

Que necesita saber antes de tomar Fluritox F sobres:

- Si es alérgico al Paracetamol, Fenilefrina o Cetirizina o a cualquiera de los componentes de la fórmula.
- Si sufre de presión alta.
- Si padece de alguna enfermedad hepática severa.
- Si esta en tratamiento con medicamentos simpaticomiméticos.
- Niños menores de 12 años.

PRECAUCIONES ESPECIALES

Población pediátrica

Debido a las concentraciones de los principios activos, los menores de 12 años no deben tomar este medicamento.

Población geriátrica

Se recomienda que las personas de edad avanzada consulten a su médico antes de utilizar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

Este medicamento puede llegar a producir somnolencia en pacientes susceptibles. Si nota alguno de estos efectos evite conducir vehículos o utilizar máquinas.

Precauciones durante el embarazo y periodo de lactancia

Si esta embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Este medicamento no debe utilizarse durante el embarazo a no ser que su médico considere que es estrictamente necesario.

Este medicamento no se puede utilizar durante el periodo de lactancia.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS:

El Paracetamol puede potencializar el efecto de los anticoagulantes orales, la Propantelina disminuye la velocidad de absorción del Paracetamol y la Metoclopramida la acelera.

Esta combinación farmacológica no deberá tomarse simultáneamente con bebidas alcohólicas, ni con medicamentos tranquilizantes del SNC, ni con inhibidores de la IMAO.

DOSIFICACIÓN

Siga las instrucciones de administración de este medicamento contenidas en el prospecto o las indicadas por su médico.

Adultos y niños mayores de 12 años: Un sobre disuelto en 1 taza de agua caliente cada 12 horas.

Forma de administración: Este medicamento se toma por vía oral. El contenido del sobre se debe disolver totalmente en el líquido antes de beberlo.

Duración del tratamiento: La toma de este medicamento esta supeditada a la aparición de los síntomas. A medida que éstos desaparezcan debe suspenderse el tratamiento.

SOBREDOSIFICACIÓN:

Si toma mas medicamento del que debe consulte inmediatamente a su médico. Si ha ingerido una sobredosis debe acudir a un centro médico lo más pronto posible, aunque no note síntomas. Los síntomas pueden incluir: mareos, vómitos, pérdida de apetito, ictericia, dolor abdominal, sequedad de boca, entre otros.

PRESENTACIÓN:

Caja x 20 sobres de 7 g polvo para reconstituir c/u + prospecto.

RECOMENDACIONES:

- Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Conservar a una temperatura no mayor a 30 °C.

VENTA BAJO RECETA MÉDICA.



Farmayala Medicines