

NORMOTEMP® MIGRA



CORPORACIÓN
FARMAYALA
Su salud es nuestro COMPROMISO.

COMPOSICIÓN:

Cada tableta contiene:

Paracetamol (Acetaminofén).....500 mg

Cafeína.....65 mg

Excipientes c.s.p.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.

- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

¿QUÉ ES NORMOTEMP MIGRA Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

Normotemp Migra es una combinación de dos principios activos: Paracetamol antipirético, analgésico, y Cafeína que contribuye a incrementar la eficacia del Paracetamol. Indicado para el tratamiento sintomático de la fiebre y/o dolor de intensidad leve a moderada.

Normotemp Migra está indicado para el alivio del dolor de cabeza, migraña (jaqueca) y otros tipos de dolores somáticos como artritis, entre otros.

¿QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR NORMOTEMP MIGRA?

No tome NORMOTEMP MIGRA

- Si es alérgico al Paracetamol, Cafeína o a cualquiera de los componentes de la fórmula.

- Si está tomando otros medicamentos que contengan Paracetamol.

- Si tiene menos de 12 años.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Consulte a su médico antes de iniciar el tratamiento con NORMOTEMP MIGRA

- Si tiene problemas hepáticos o renales.

- Si tiene un peso insuficiente o desnutrición.

- Si padece de asma o tiene sensibilidad a la aspirina.

- Si tiene gota, hipertiroidismo o arritmia.

No deben consumirse bebidas alcohólicas mientras se toma este medicamento, ya que el consumo de alcohol en combinación con Paracetamol puede provocar daño hepático. Durante la toma de este medicamento se debe reducir el consumo de productos que contengan Cafeína, ya que un exceso de Cafeína puede provocar nerviosismo, irritabilidad, insomnio y en ocasiones aumento de la frecuencia cardiaca.

Población pediátrica

No se recomienda el uso en menores de 12 años.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO

Informe a su médico si está tomando otros medicamentos con Paracetamol o cualquier medicamento que le hayan recetado, en especial Metoclopramida, Domperidona o Colestiramina. El uso simultáneo de fármacos anticoagulantes como Warfarina, puede provocar ligeras variaciones de los valores del INR. Si necesita tomar un analgésico diariamente, consulte a su médico, ya que existe riesgo de hemorragia. Sin embargo, puede tomar dosis ocasionales de este medicamento junto con anticoagulantes.

Informe a su médico si está tomando cualquiera de los siguientes medicamentos:

- Medicamentos para tratar las infecciones como Rifampicina, Isoniazida, Cloranfenicol,

Ciprofloxacina.

- Terbinafina, Zidovudina, medicamentos para el vaciado gástrico lento.

- Barbitúricos y Benzodiazepinas, Litio o Fluvoxamina, Disulfiram, simpaticomiméticos, Levotiroxina, Teofilina, Cimetidina, Nicotina, antiepilépticos, Clozapina, medicamentos para la gota.

EMBARAZO Y LACTANCIA

No se recomienda el uso de este medicamento durante el embarazo. Se debe evitar su uso durante la lactancia. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico antes de utilizar el medicamento.

CONDUCCIÓN Y USO DE MÁQUINAS

La influencia de este medicamento sobre la capacidad para conducir u operar maquinaria es nula o insignificante.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL

En caso de sobredosis, solicite atención médica de forma inmediata, incluso si el paciente se encuentra bien debido al riesgo de daño hepático.

¿CÓMO TOMAR NORMOTEMP MIGRA?

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral

POSOLÓGIA

Dosis recomendada: 1 a 2 tabletas con agua hasta 4 veces al día, según sea necesario. En caso de duda, consulte a su médico. No tomar más de 8 comprimidos al día.

En adolescentes de 12 a 15 años, se recomienda administrar una dosis de 1 tableta 4 veces al día. Debe transcurrir al menos 4 horas entre cada toma. No exceder de 2 g/día, salvo indicación médica.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Deje de tomar el medicamento e informe a su médico si experimenta:

- Reacciones alérgicas como erupción cutánea o picazón, a veces con afecciones respiratorias o edema en labios, lengua.

- Erupción severa con descamación de la piel.

- Si se siente mareado, inquieto o nervioso.

Estas reacciones son muy raras. Si experimenta efectos adversos, incluso que no aparecen en este prospecto, informe a su médico.

CONSERVACIÓN

- Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

- Conservar en el envase original para protegerlo de la luz.

- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad.

- Conservar a temperatura no mayor a 30 °C.

PRESENTACIÓN

Caja x 50 tabletas + prospecto.

VENTA LIBRE



Elaborado por INDEUREC S.A. Durán - Ecuador.

FPC S.a.
FARMAYALA
PHARMACEUTICAL
CORPORATION S.A.
Farmayala Medicines

www.farmayala.com